

Když můj lékař nařídil společně s obvyklým PAP testem (klasické cytologické vyšetření) provést i test na HPV, změnilo mi to život. Moje výsledky PAP testu byly normální, ale test na HPV byl pozitivní na jeden z nejrizikovějších genotypů HPV, které

mohou vést k rozvoji rakoviny děložního čípku. Můj lékař nařídil důkladné vyšetření, aby se s jistotou prokázalo, že nemám známky prekancerózních změn. Jsem velmi ráda, že jsem odhalila svoje riziko a mohla podniknout kroky k prevenci rakoviny děložního čípku.




80% žen na světě se v průběhu života nakazí virem HPV.

- HPV (Human papilloma virus) je velmi rozšířený a přenáší se sexuálním stykem.
- Každý může mít pozitivní výsledek na HPV, i když již mnoho let žije v monogamním vztahu. Virus totiž může dlouhou dobu v těle přežívat.
- Když jste HPV pozitivní, není to odraz Vašeho chování nebo Vašeho životního stylu, protože HPV je v intimních vztazích velmi rozšířený.
- Existuje přes 100 typů HPV, ale jenom 14 z nich je považováno za rizikové pro rozvoj rakoviny děložního čípku a z nich pouze typy 16 a 18 jsou nejrizikovější.
- Většina infekcí virem HPV je bezpříznakových, bezbolestných a imunitní systém člověka se s nimi vypořádá, nicméně u některých žen infekce HPV přetrvává.

Když víte, zda máte HPV typu 16 a 18, znáte také svoje riziko rozvoje rakoviny děložního čípku.

Existují nízkorizikové typy (genotypy) viru HPV, které rakovinu děložního čípku nezpůsobují. Existuje ale také řada vysoce rizikových typů, které jsou s rakovinou spojovány, ačkoliv ji nemusí nutně způsobit. Ve skutečnosti má 70% žen s rakovinou děložního čípku nejrizikovější typy HPV 16 a 18. A tak pokud jste HPV pozitivní, je důležité vědět, jaký typ HPV máte, abyste mohla riziku plně porozumět.



Mnoho testů na HPV jenom stanoví, zda jste na HPV pozitivní či negativní. Pokud je Váš test pozitivní, Váš lékař vám někdy doporučí počkat rok do dalšího vyšetření. Proč ale čekat, když si můžete nechat udělat HPV test, který Vám okamžitě sdělí, zda je u

Vás riziko rozvoje rakoviny děložního čípku vysoké či nikoliv?



Jenom test cobas® HPV poskytne Vašemu lékaři zevrubnou informaci o tom, jaké máte riziko – stačí k tomu jeden test.

Test cobas® HPV unikátní technologií identifikuje HPV 16 a 18 mezi všemi ostatními druhy a Váš lékař tak má v rámci jednoho testu ucelený přehled o riziku a může okamžitě rozhodnout o dalších vyšetřeních a prevenci. Nemusíte čekat na další návštěvu a další výsledky testů, preventivní kroky můžete začít dělat hned.

Začněte s prevencí – požádejte svého lékaře, aby Vám kromě testu PAP (klasické cytologické vyšetření) nechal udělat i test cobas® HPV. Získáte tak včas informaci, kterou Vám samotný PAP neposkytne.

Nezapomeňte se také každý rok objednat na prohlídku a proberte se svým lékařem další důležité aspekty Vašeho zdraví:

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKU


PLÁNOVÁNÍ RODINY

MAMOGRAFII A KOLONOSKOPII

RIZIKOVÉ KARDIOVASKULÁRNÍ FAKTORY

PREVENCI OSTEOPORÓZY





HPV způsobuje rakovinu děložního čípku.

Rakovina děložního čípku je druhým nejrozšířenějším typem nádorového bujení u žen na celém světě. Neodhalená infekce HPV je jeho největší příčinou. Proto potřebujete vědět, zda jste na HPV pozitivní, při včasné detekci lze totiž rakovinu děložního čípku úspěšně předejít.

HPV a PAP testy – zdravá kombinace

V době, kdy PAP test (klasické cytologické vyšetření) odhalí abnormální buněčné změny, už se prekanceróza děložního čípku rozvíjí. Pokud se ale k PAP testu přidá ještě test na HPV, lze zjistit, jaké je Vaše riziko vniku změn na děložním čípku i v případě, že ještě nejsou zaznamenány pomocí PAP testu. Váš lékař může ale provést test na HPV i v případě, že je PAP test abnormální, protože oba testy lze provést z jednoho vzorku. Vy tak získáte kompletní informaci při jedné návštěvě u lékaře.



HPV pozitivní diagnóza neznamená, že máte rakovinu děložního čípku, znamená to jenom, že je u Vás zvýšené riziko a Vy můžete provést kroky bránící jejímu pozdějšímu rozvoji.

Jaké je riziko, že onemocníte rakovinou děložního čípku?

Pokud to nevíte, zjistěte to ještě dnes, protože rakovinu děložního čípku lze předcházet.

- 1 Rakovina děložního čípku je celosvětově druhé nejčastěji se vyskytující zhoubné bujení u žen.
- 2 Rakovina děložního čípku je způsobena virem HPV.
- 3 Rakovinu děložního čípku lze předcházet včasnou diagnózou nebo, v závislosti na Vašem věku, očkováním proti viru HPV.
- 4 U 80% žen na světě se v průběhu jejich života HPV objeví – infekce HPV neznamená, že onemocníte rakovinou děložního čípku.
- 5 I když jste byla očkována proti HPV, stejně musíte být pravidelně kontrolována na výskyt rakoviny děložního čípku.
- 6 Samotný PAP test (klasické cytologické vyšetření) někdy cervikální abnormality neodhalí – zeptejte se svého lékaře, zda by u Vás nebylo vhodné provést současně s PAP i test na HPV.
- 7 Téměř 1 ze 7 žen s normálními výsledky PAP testu měla na děložním čípku prekancerózní změny.
- 8 Až jedna třetina případů rakoviny děložního čípku se objevila u žen, které již byly vyšetřeny. Proto je důležité znát své riziko a podniknout preventivní kroky.
- 9 70% žen, u kterých byla diagnostikována rakovina děložního čípku, mají vysoce rizikové genotypy 16 a 18. Ačkoliv mnoho testů odhalí, zda jste HPV pozitivní, vy potřebujete vědět přesně, zda máte HPV typu 16 a 18.
- 10 Zeptejte se svého lékaře na test cobas® HPV a získáte úplný obrázek o tom, jaké je Vaše riziko. Stačí jeden test.
- 11 HPV testace je preferovaným screeningovým postupem pro ženy ve věku 30-65 let, v nižším věku má přínos díky negativní prediktivní hodnotě u nejasných cytologií.



DAMIER s.r.o.

CYTOLOGICKÁ LABORATOŘ BRNO

Damier s.r.o., cytologická laboratoř

Štefánikova 16, 602 00 Brno

Web: www.damier.cz, e-mail: info@damier.cz, telefon: 549 523 286

Kontaktní osoba pro vyšetření HPV: Mgr. Irena Večerková

Rakovina děložního čípku. Víte, jaké máte riziko?



Já to své znám.

Důležité informace, které byste měly znát o prevenci rakoviny děložního čípku.



cobas®